


Xương mỏm cùng vai không hợp nhất (os acromiale)

Os acromiale: phần phía trước của mỏm cùng vai chưa hợp nhất với phần còn lại của mỏm cùng vai trong quá trình trưởng thành của xương.

Kieran Hirpara © ⓘ ⓘ 4.0



Trang này được dịch bằng máy và chưa được bác sĩ kiểm tra. **Bản tiếng Anh** là bản chính thức.

Những cảm giác mà bạn đang trải qua

Với xương mỏm cùng vai không hợp nhất (os acromiale), cơn đau thường nằm ở phía trước và bên ngoài vai, ngay trên phần mái xương của khớp. Các hoạt động đưa tay lên cao làm cơn đau nặng hơn. Với lấy đồ trên kệ cao, phơi quần áo hoặc nâng vật gì đó lên cao hơn tầm vai đều có thể gây đau. Nhiều người cũng bị đau về đêm, và cơn đau có thể khiến bạn thức giấc khi nằm nghiêng về bên vai đó.

Cơn đau xuất phát từ một mảnh xương nhỏ ở đỉnh vai đã không liên vào phần còn lại trong quá trình phát triển. Khi bạn nâng tay, một cơ kéo mảnh xương lỏng lẻo này và nó di chuyển nhẹ, đè lên gân nằm bên dưới. Vị trí tiếp giáp giữa hai mảnh xương cũng có thể đau khi chạm vào, và ấn trực tiếp vào đó có thể gây ra cơn đau.

Trong sinh hoạt hằng ngày, bạn có thể thấy tay yếu khi dang tay sang ngang hoặc xoay tay ra ngoài. Cứng đau là hiện tượng phổ biến: vai bị đau ở khoảng giữa động tác khi bạn nâng tay lên, rồi đỡ đau khi nâng cao hơn. Vì các triệu chứng rất giống tình trạng hao mòn ở gân nằm dưới mái vai, bệnh này dễ bị nhầm với một vấn đề về cơ chóp xoay, và nó có thể tiếp tục gây đau ngay cả sau khi đã điều trị vấn đề đó.

Hầu hết những người có dạng xương này không bao giờ cảm thấy gì cả. Tình trạng này thường được phát hiện tình cờ trên phim chụp vì một lý do khác. Khi gây đau, nó thường xuất hiện ở người trưởng thành trẻ tuổi, thường không có chấn thương nào, và nên nghĩ đến tình trạng này nếu cơn đau vai của bạn không thuyên giảm sau vật lý trị liệu, tạm nghỉ chơi thể thao hoặc tiêm thuốc.

Nếu các triệu chứng của bạn không thuyên giảm, ngày càng nặng hơn qua nhiều tuần, khiến bạn thức giấc vào ban đêm, hoặc khiến bạn không thể làm việc hay sử dụng cánh tay, hãy đến gặp bác sĩ đa khoa hoặc đề nghị được bác sĩ chuyên khoa khám.

Chuyện gì đang thực sự xảy ra

Mái xương của vai bạn không hình thành từ một khối xương duy nhất. Nó bắt đầu từ ba trung tâm riêng biệt dần dần liên lại với nhau, bắt đầu vào khoảng 15 tuổi và thường hoàn tất vào khoảng 25 tuổi. Ở khoảng 8% số người, một trong các chỗ nối này không bao giờ khép lại. Khe hở được lấp đầy bằng mô dai giống như sụn thay vì xương, khiến một mảnh nhỏ của mái xương được gắn bằng một mô nối mềm dẻo thay vì xương đặc.

Hãy hình dung như một tấm ván được gắn vào tường bằng một con vít bị lỏng. Tấm ván vẫn được giữ, nhưng hơi xô dịch khi bạn tì vào nó. Cơ nâng tay sang ngang bám vào mái xương này, vì vậy mỗi lần bạn nâng tay, cơ đó kéo mảnh xương lỏng lẻo và nó hơi uốn cong. Chuyển động đó đè xuống gân chạy bên dưới mái xương, và sự cọ xát làm gân bị kích ứng. Đó là lý do các hoạt động đưa tay lên cao gây đau và cơn đau nằm ở phía trước và bên ngoài vai.

Bản thân mô nối mềm dẻo cũng có thể là vấn đề. Nó có thể tự trở nên đau, giống như một khớp bị hao mòn, và ấn vào đó sẽ gây ra cơn đau. Hầu hết những người có dạng xương này không bao giờ cảm thấy gì, và tự bản thân nó dường như không gây đau vai hay làm tăng nguy cơ rách gân. Nhưng khi mảnh xương lỏng lẻo bắt đầu di động nhiều hơn bình thường, do cách nó được hình thành hoặc sau một cú va chạm vào vùng đó, nó có thể đè lên gân mỗi khi bạn nâng tay. Đó là nguyên nhân gây ra cung đau và đau về đêm như đã mô tả ở trên.

Vì mảnh xương lỏng lẻo nằm ngay tại vị trí của gân, hai vấn đề này thường xuất hiện cùng nhau. Nếu vai của bạn đã được điều trị một vấn đề về gân mà cơn đau vẫn không thuyên giảm, nên kiểm tra xem có mảnh xương chưa hợp nhất này hay không, vì chỉ phẫu thuật gân sẽ không làm yên được một mảnh xương di động nằm phía trên nó.

Những biện pháp chúng tôi có thể áp dụng

Bác sĩ Kieran Hirpara, bác sĩ phẫu thuật chi trên tại Bệnh viện tư nhân Mater Rockhampton, sẽ bắt đầu bằng các phương pháp ít xâm lấn nhất phù hợp với tình trạng của bạn. Thông thường, bệnh nhân được bác sĩ đa khoa giới thiệu đến phòng khám chúng tôi; nếu nhà vật lý trị liệu khuyên bạn nên đến gặp chúng tôi, bạn vẫn cần có giấy giới thiệu từ bác sĩ đa khoa để được hưởng mức hoàn trả từ Medicare. Trong lần khám đầu tiên, chúng tôi sẽ hỏi bệnh sử, khám vai và chỉ định chụp hình ảnh nếu cần thiết.

Bước đầu tiên thường là thay đổi cách bạn sử dụng vai và kiên trì tập vật lý trị liệu đúng mức. Vật lý trị liệu nhằm làm dịu tình trạng kích ứng bên dưới mái xương và tăng cường các cơ quanh vai để chúng chịu đựng tốt hơn các công việc phải đưa tay lên cao. Hãy áp dụng biện pháp này trong một thời gian hợp lý trước khi cân nhắc các phương pháp tiếp theo.

Thuốc giảm đau có thể giúp bạn tiếp tục vận động trong thời gian đó. Các thuốc kháng viêm đơn giản, dùng theo hướng dẫn của bác sĩ đa khoa, giúp làm dịu cơn đau để bạn có thể tập các bài tập một cách thoải mái. Nếu cơn đau không thuyên giảm, ngày càng nặng hơn qua nhiều tuần, khiến bạn thức giấc vào ban đêm, hoặc khiến bạn không thể làm việc hay sử dụng cánh tay, hãy đến gặp bác sĩ đa khoa hoặc để nghị được bác sĩ chuyên khoa khám.

Khi điều trị không phẫu thuật không mang lại đủ cải thiện, chúng tôi sẽ cân nhắc phẫu thuật. Trước đó, chúng tôi xác nhận chẩn đoán bằng phim X-quang thường, gần như luôn đủ để thấy mảnh xương chưa hợp nhất. Một phim chụp từ phía dưới nách cho thấy rõ hình dạng của khớp và phần phía trước của mác xương, và điều này quan trọng vì chấn thương có thể làm tổn thương chỗ tiếp giáp giữa hai mảnh xương. Siêu âm là cách đơn giản và chính xác để kiểm tra gân chạy bên dưới mác xương, và chụp MRI cho hình ảnh đầy đủ hơn về gân đó và các mô mềm xung quanh.

Ca phẫu thuật chúng tôi thường đề xuất nhất là đánh giá khớp qua nội soi (phẫu thuật lỗ khóa) kèm cắt bỏ bao hoạt dịch, nghĩa là loại bỏ mô bị viêm khỏi khoang bên dưới mác xương, sau đó rạch một đường mở nhỏ để ghép xương và cố định, nghĩa là giữ yên mảnh xương lỏng lẻo để nó có thể liền vào phần còn lại của xương. Việc giữ yên giúp hai mảnh xương liền lại với nhau. Nếu mảnh xương lỏng lẻo nhỏ, chúng tôi có thể cắt bỏ nó thay vì cố định. Việc cố định một mảnh xương lớn hơn cần thận trọng, vì cơ nâng tay của bạn liên tục kéo lên nó và mảnh xương thì mỏng. Đôi khi mảnh xương không liền lại sau khi cố định, gọi là không liền xương. Chúng tôi sẽ trao đổi với bạn về phương án phù hợp với vai của bạn và cùng nhau quyết định.

Những điều bạn có thể mong đợi

Hầu hết những người có dạng xương này không bao giờ gặp vấn đề gì và không cần điều trị. Khi nó gây đau, tiên lượng phụ thuộc vào việc mảnh xương lỏng lẻo có ổn định hay không và liệu nó có thực sự là nguồn gốc gây đau của bạn hay không.

Với trường hợp gây đau, việc điều trị thường bắt đầu mà không cần phẫu thuật. Thay đổi cách sử dụng vai, vật lý trị liệu và thuốc giảm đau đơn giản giúp tình trạng ổn định ở nhiều người. Nếu các biện pháp đó không hiệu quả sau một thời gian hợp lý, phẫu thuật có thể giúp giảm đau rõ rệt và cải thiện chức năng vai. Khi mảnh xương lỏng lẻo được giữ yên và liền vào phần còn lại của xương, kết quả trên các thang đo chức năng vai tốt hơn so với khi hai mảnh xương vẫn tách rời. Tuy nhiên, phẫu thuật không phải lúc nào cũng là giải pháp. Ở một số người mắc tình trạng này kèm theo rách gân, kết quả sau phẫu thuật không đồng đều, với 53% đạt kết quả hài lòng nói chung.

Nếu không được điều trị và tình trạng này tiếp tục gây phiền toái, cơn đau thường không tự biến mất. Nó cũng có thể dễ bị bỏ sót: nên nghĩ đến tình trạng này khi cơn đau vai không thuyên giảm sau điều trị, kể cả sau phẫu thuật cho một vấn đề về gân, vì chỉ phẫu thuật gân sẽ không làm yên được một mảnh xương di động nằm phía trên nó.

Quá trình hồi phục sau phẫu thuật diễn ra từ từ. Bạn sẽ tập luyện cùng nhà vật lý trị liệu, phục hồi khả năng cử động trước rồi đến sức mạnh, và khả năng nâng vật lên cao sẽ trở lại dần dần trong nhiều tuần đến nhiều tháng. Mục tiêu là có một bờ vai đáp ứng được sinh hoạt hằng ngày mà không còn cơn đau nhói khi nâng tay như lúc bạn đến khám.

Nếu bạn nhận thấy một ngón tay, bàn tay hoặc cánh tay trở nên nóng, đỏ, sưng và đau, đặc biệt khi kèm theo sốt, hãy đến khoa cấp cứu ngay trong ngày. Bạn không cần giấy giới thiệu của bác sĩ đa khoa.

Khi nào nên gặp bác sĩ

Hầu hết những người có dạng xương này không bao giờ cần điều trị, nhưng hãy đến gặp bác sĩ đa khoa hoặc đề nghị được bác sĩ chuyên khoa khám nếu cơn đau vai không thuyên giảm, ngày càng nặng hơn qua nhiều tuần, khiến bạn thức giấc vào ban đêm, hoặc khiến bạn không thể làm việc hay sử dụng cánh tay. Hãy đề nghị được khám sớm hơn nếu cơn đau nằm ở phía trước và bên ngoài vai, nặng hơn khi đưa tay lên cao, hoặc liên tục khiến bạn thức giấc khi nằm nghiêng về bên vai đó. Cũng nên đi khám nếu điểm đau ở đỉnh vai đau khi ấn vào, nếu tay bạn yếu khi dang sang ngang hoặc xoay ra ngoài, hoặc nếu vai bị đau ở khoảng giữa động tác khi bạn nâng tay lên. Người trưởng thành trẻ tuổi có những triệu chứng này mà không có chấn thương nên được kiểm tra tình trạng này, đặc biệt nếu vật lý trị liệu, tạm nghỉ chơi thể thao hoặc tiêm thuốc không giúp ích. Nếu một ngón tay, bàn tay hoặc cánh tay trở nên nóng, đỏ, sưng và đau, đặc biệt khi kèm theo sốt, hãy đến khoa cấp cứu ngay trong ngày; bạn không cần giấy giới thiệu của bác sĩ đa khoa.

Phân tích chi tiết hơn

Phần này đi sâu hơn mức cần thiết để bạn có thể tự đưa ra quyết định điều trị. Cấu trúc xương acromiale là một dạng biến thể giải phẫu bình thường ở một tỷ lệ đáng kể dân số; thường thì nó không gây ra bất kỳ triệu chứng nào, nhưng lại thường bị cho là nguyên nhân gây đau vai dù thực tế không phải vậy. Vì vậy, việc tìm hiểu thêm về nó là hữu ích.

ĐỊNH NGHĨA VÀ MỨC ĐỘ PHỔ BIẾN

Mỏm cùng vai – phần xương nằm phía trên khớp vai – được hình thành từ nhiều trung tâm ossification riêng biệt; những trung tâm này thường hợp nhất vào cuối tuổi thiếu niên hoặc đầu tuổi hai mươi. Ở một số người, một trong các trung tâm này không hợp nhất, tạo thành một mô nối sợi xơ vĩnh viễn. Đó chính là “os acromiale”, và nó có mặt từ thời niên thiếu chứ không phải là hậu quả của chấn thương hay bệnh lý nào.

Tỷ lệ xuất hiện của os acromiale thay đổi tùy theo dân số. Một nghiên cứu đa trung tâm trên **6.842** bệnh nhân cho thấy **os acromiale có liên quan đến các chấn thương gân cơ chóp xoay**; tỷ lệ mắc bệnh ở dân số Nhật Bản thấp hơn so với các dân số không phải châu Á; kích thước mảnh xương này thường nhỏ hơn, khoảng [1].

Mối liên hệ giữa os acromiale và tổn thương gân cơ chóp xoay cần được hiểu một cách cẩn thận: nó chỉ chứng minh rằng hai tình trạng này thường xuất hiện cùng nhau nhiều hơn mức ngẫu nhiên, chứ không có nghĩa là os acromiale gây ra vết rách gân. Cơ chế có thể xảy ra theo cả hai hướng: mảnh xương chưa hợp nhất có thể di chuyển nhẹ dưới tác động của cơ delta, gây kích ứng gân phía dưới; hoặc chính cơ chế vận động của vai vốn dễ dẫn đến bệnh lý gân cơ chóp xoay lại khiến mảnh xương không ổn định gây ra triệu chứng.

LIỆU NÓ CÓ PHẢI LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY ĐAU HAY KHÔNG MỚİ LÀ VẤN ĐỀ CỐT LỎI

Do có thể nhìn thấy được, tồn tại vĩnh viễn và có hình dạng bất thường trên hình ảnh chẩn đoán, mảnh xương acromion thường được coi là nguyên nhân gây đau vai. Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp đều không gây triệu chứng; phần lớn những người có mảnh xương này thậm chí còn không hề hay biết.

Điểm phân biệt giữa các trường hợp có triệu chứng và không triệu chứng là tình trạng đau nhức khu trú ngay tại vị trí mảnh xương, cơn đau xuất hiện khi ấn vào chỗ đó; nếu tiến hành tiêm chẩn đoán, cơn đau sẽ giảm đi chỉ khi tiêm vào vùng nối giữa các mảnh xương chứ không phải vào khoang dưới acromion. Nếu không có những dấu hiệu này, tốt nhất nên coi việc phát hiện ra mảnh xương này là một phát hiện ngẫu nhiên mà thôi.

Các dạng phụ của tình trạng này thường được phân loại dựa trên vị trí hợp nhất của các mảnh xương [2]; điều này có ý nghĩa quan trọng trong phẫu thuật vì kích thước của mảnh xương di động sẽ quyết định việc có thể cắt bỏ nó hay phải cố định lại.

TẠI SAO NÓ GÂY PHỨC TẠP CHO CÁC CA PHẪU THUẬT VAI KHÁC

Tầm quan trọng thực tế của hiện tượng có mảnh xương acromiale thường không nằm ở các triệu chứng do chính nó gây ra, mà là ở ảnh hưởng của nó đối với các ca phẫu thuật dự định thực hiện cho các vấn đề khác.

Cơ deltoid bám vào móm acromion; vì vậy, nếu mảnh xương chưa liền lại thì lực kéo từ cơ này sẽ tác động lên vùng nối còn đang di động. Việc cắt bỏ xương ở mặt dưới móm acromion – như trong thủ thuật acromioplasty – sẽ làm mỏng thêm mảnh xương vốn đã không ổn định; điều này có thể biến một dạng biến thể vốn không gây triệu chứng thành dạng gây đau đớn hoặc dẫn đến tình trạng không liền xương. Đây là lý do quan trọng nhất để phát hiện hiện tượng này qua hình ảnh chẩn đoán trước phẫu thuật: không phải để điều trị nó, mà là để tránh làm mất ổn định mảnh xương.

Trong trường hợp thực sự cần điều trị, lựa chọn là cắt bỏ mảnh xương nhỏ hoặc cố định mảnh xương lớn hơn. Việc cố định xương qua vùng nối này được biết là rất khó khăn: mảnh xương mỏng, lực kéo từ cơ deltoid tác động liên tục lên nó, và tỷ lệ không liền xương cũng khá cao. Chính mức độ khó khăn này cũng là lý do để chúng ta phải chắc chắn rằng mảnh xương acromiale thực sự là nguyên nhân gây đau trước khi tiến hành phẫu thuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Kozono N, Nishii A, Ishitani E, Mizuki Y, Kimura T, Yamamoto S, và cộng sự. Tỷ lệ mắc và các yếu tố liên quan đến hiện tượng có xương móm vai: một nghiên cứu đa trung tâm. JSES Int. 2025;9(5):1541-5. <https://doi.org/10.1016/j.jseint.2025.05.015>

[2] Boehm TD, Matzer M, Brazda D, Gohlke FE. Điều trị phẫu thuật tình trạng có xương mòm vai đi kèm với rách gân cơ chóp xoay: tổng quan trên 33 bệnh nhân. J Bone Joint Surg Br. 2003;85(4):545-9. <https://doi.org/10.1302/0301-620X.85B4.13634>